



Nick van Zwol
Apt. Garatuja 5372

Tlm. (+351) 926 519 770
7630-445 São Luís, Odemira

INSTRUÇÕES DE PÓS-APLICAÇÃO

O processo de cicatrização de uma tatuagem demora cerca de uma semana.

Estado geral de saúde e aptidão física desempenham um papel importante neste processo.

Durante o processo de cicatrização, a tatuagem pode causar alguma comichão. A higiene pessoal é imprescindível durante o tempo de cicatrização da tatuagem.

Imediatamente após a tatuagem, o local tatuado é coberto com um spray de feridas, uma compressa esterilizada ou uma película adesiva transparente também esterilizada.

O spray ferida ou película adesiva deve permanecer na tatuagem até que a ferida tenha cicatrizado (3-6 dias). Pode tomar duche normalmente com o spray e a película aplicados.

O spray desaparece por si só. Se algum líquido da ferida se desenvolve sob a película, pode cair mais cedo.

Se, no entanto, a tatuagem for coberta com uma compressa esterilizada (não transparente) ou pomada gordurosa e película aderente (papel filme), é possível remover este após algumas horas e tratamento da ferida, tal como descrito abaixo.

Tratar a tatuagem como se segue:

- Toque na tatuagem o menos possível com as mãos.
- Limpe o local duas vezes ao dia com um sabonete sem cheiro suave até que a ferida esteja curada completamente.
- Humedeça a tatuagem após a lavagem e seque delicadamente com uma toalha limpa.
- Lubrifique a tatuagem, se desejar (com as mãos lavadas) com a pomada que lhe foi dada pelo tatuador.
- Não deixe ninguém utilizar a sua pomada e não use outra pomada.
- Não utilize desinfetantes de feridas como Sterilon ou Betadine sobre a ferida.
- Não coloque pensos ou ligaduras na tatuagem.
- Nunca use roupas apertadas ou sujas sobre a tatuagem.
- Evite tomar banho de imersão durante o processo de cicatrização (piscinas cloro, banheiras de hidromassagem, piscinas naturais). • Não utilize a sauna ou banho de vapor.
- Não exponha a ferida ao sol ou bronzamento (nem mesmo com filtro solar).
- Além disso, mesmo após a tatuagem estar cicatrizada, use sempre um filtro solar de alta proteção, enquanto se bronzear.
- Em caso de extrema vermelhidão, inchaço, sangramento, inflamação, mudança de cor ou dor, consulte o seu médico e tatuador.